

**PRINCIPIOS ACTIVOS**

Sildenafil (Citrato) 50 mg
Sildenafil (Citrato) 100 mg

CATEGORÍA TERAPÉUTICA

Disfunción eréctil

TERMINOS RELACIONADOS

Herex®, Sildenafil

PRESENTACIÓN

Estuche x 1
Tabletas Recubiertas
Estuche x 4
Tabletas Recubiertas

DATOS DE CALIDAD

No requiere Bioequivalencia

LINEA PME**PAISES REGISTRADOS**

Costa Rica, Honduras.

Tratamiento oral para la disfunción eréctil.

DOSIS RECOMENDADA: La dosificación de Herex es de criterio médico. Sin embargo, para la mayoría de pacientes la dosis recomendada es de 50 mg. El rango de dosificación es de 25 mg a 100 mg. Antes de iniciar el tratamiento con Herex, se recomienda un diagnóstico médico de la disfunción eréctil para determinar sus causas, e identificar el tratamiento más apropiado.

INDICACIONES: Herex está indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil o incapacidad de lograr o mantener una erección suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. La eficacia de Herex requiere de una estimulación sexual adecuada.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de Herex. Está contraindicado en individuos que están en tratamiento con nitratos. Debido a que la actividad sexual se asocia con cierto grado de riesgo cardíaco, es recomendable que el médico considere el estado cardiovascular de sus pacientes antes de iniciar cualquier tratamiento para la disfunción eréctil. Herex debe usarse con cautela en pacientes con deformaciones anatómicas del pene (como la angulación, la fibrosis cavernosa o la enfermedad de Peyronie), o en pacientes con afecciones que puedan predisponerlos al priapismo.

Web: www.labstein.com

Email: cliente@labstein.com

Servicio al cliente:

800-STEINSA (800-783-4672)

Central: (506) 2550-6565

Fax: (506) 2550-6535

Apdo Postal: 930-1007

V/04/11



©2010 - Laboratorios Stein S.A.
1 km al sur del cruce de Taras,
sobre autopista Florencio del Castillo,
Cartago, Costa Rica